ENERGAN 50

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	**ENERGAN 50**	
REGISTRO ICA:	**2229 DB**	
TITULAR REGISTRO	**PHARMAVET LTDA**	
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Sebastian Arciniegas	**Cesar Poveda**	**Sebastian Arciniegas**
DIRECTOR CIENTIFICO	**DIR. TECNICO**	**DIRECTOR CIENTIFICO**
FECHA: MAYO 2/2012	FECHA:MAYO3 /2012	FECHA:MAYO 3 /2012

1. **NOMBRE DEL PRODUCTO: ENERGAN 50**

2. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA:**

   Dextrosa Anhidra USP 50 gr
   Excipientes c.s.p 100 mL

3. **FORMA FARMACEUTICA:** SOLUCION INYECTABLE

4. **DATOS CLINICOS**

4.1 INDICACIONES TERAPEUTICAS**:**

ENERGAN 50 es un producto inyectable empleado como aporte energético y para corregir problemas energéticos como hipoglicemia y acetonemia. Indicado en el tratamiento de Toxemias y como Diurético Osmótico. Puede ser utilizado en todas las especies animales.

4.2 POSOLOGIA Y ADMINISTRACION:

EQUINOS Y BOVINOS 100 a 500 mL
OVINOS, PORCINOS, CAPRINOS 30 a 100 mL
PERROS Y GATOS 5 mL/Kg.
Aplicar mediante inyección intravenosa lenta o a través de equipo de venoclisis. Estas dosis pueden variar según criterio del Médico Veterinario.

Ficha Técnica
Propiedad de Pharmavet Ltda

Propiedad de Pharmavet Ltda
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento

4.3 CONTRAINDICACIONES:

No administrar el producto en caso de hemorragia intracraneal o intraespinal, ni en caso de observar delirios debido a deshidrataciones.
No suministrar al tiempo con sangre en caso de necesitar transfusiones sanguíneas, utilizando el mismo equipo de transfusión debido a que puede generar pseudo aglutinación de células rojas.

4.4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- En animales con diagnostico comprobado de Diabetes mellitus, utilizar el producto solo bajo estricta recomendación del Médico Veterinario.
- Rápida infusión del producto puede ocasionar flebitis y tromboflebitis en el sitio de la inyección.
- Una administración rápida del producto puede ocasionar hiperglicemia y/o síndrome hiperosmotico, se debe monitorear la aplicación evaluando síntomas como pérdida de conciencia especialmente en pacientes con intolerancia a los carbohidratos.
- Usos prolongados del producto pueden ocasionar déficit de electrolitos especialmente el potasio y el fosfato sérico.se debe monitorear los electrolitos en sangre y tomar los correctivos de ser necesario.
- No utilizar la solución si presenta precipitado o enturbiamiento.
- Preferiblemente no utilizar el excedente después de perforado el tapón.
  Mantenga fuera del alcance de los niños

Ficha técnica
Propiedad de Pharmavet Ltda

4.5 INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS:

No es recomendable mezclar este producto con otros medicamentos, en caso de ser necesario hacerlo bajo estricta responsabilidad del Médico Veterinario tratante con estricto cumplimiento de las técnicas asépticas. No almacenar el producto.

4.6 PREÑEZ Y LACTANCIA

No se han descrito afecciones causadas por el uso del producto en animales gestantes, ni lactante. Sin embargo se debe ejercer precaución en el uso del producto.

4.7 REACCIONES ADVERSAS

El Sindrome hiperosmolar puede suceder en caso de rápida infusión del producto, resultando en pérdida de conciencia.
Pueden ocurrir reacciones individuales al uso del producto o a la técnica de utilización, resultando en reacciones febriles, infecciones en el sitio de aplicación, flebitis o tromboflebitis, extravasación o hipervolemia.
Si una reacción adversa ocurre suspenda la utlización del producto, evalue al paciente y tome las medidas correctivas necesarias.

Propiedad de Pharmavet Ltda
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento

5. **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Solución liquida translucida a ligeramente amarillenta, estéril, envasada en Bolsas de PVC tipo hospitalario por 500 mL. Empacadas en cajas de cartón. Embalado en Cajas por 30 Unidades del producto.

6. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar Directa.
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto.

7. **INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO:**

- Retire la cubierta plástica del pitorro
- Introduzca a través del tapón de silicona la punta estéril del venoclisis o la aguja estéril de la jeringa.
- Purgue la burbuja de aire del venoclisis o la jeringa previa al empleo de la solución.
- Aplique la solución directamente al torrente circulatorio mediante inyección intravenosa lenta o mediante goteo controlado (venoclisis).
- Conserve la esterilidad de todos los elementos utilizados debido al riesgo de septicemia que existe en la utilización de productos de aplicación intravenosa.
- Si no requiere utilizar todo el contenido de la bolsa, deseche el excedente, absténgase de guardar y emplear remanentes del producto.

Ficha Técnica
Propiedad de Pharmavet Ltda

8. **VIDA UTIL**: 3 AÑOS

9. **NOTA.**
La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de la forma indicada.

Propiedad de Pharmavet Ltda
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento